

# Как оказать ребенку первую помощь при электротравме

-  Прекратите контакт ребенка с источником электрического тока: например, выдерните вилку из розетки или выключите блок электропитания.
-  Если невозможно разомкнуть электрическую цепь, удалите источник тока с помощью изолирующих предметов: одежды, веревки, кожаных или резиновых перчаток, резины, автомобильной шины, сухих досок и др.
-  Вызовите скорую медицинскую помощь, даже если ребенок выглядит здоровым. Уложите ребенка горизонтально, освободите грудную клетку от одежды. Определите степень тяжести ожога.
-  При ожоге I степени тяжести успокойте ребенка, дайте ему выпить теплый чай или успокоительные средства. На ожоговую рану наложите смоченную повязку.
-  При ожоге II, III и IV степеней первую помощь оказывает врач. При ожоге II степени тяжести, если у ребенка нет артериальной гипотензии и аритмии, врач все лекарственные средства вводит внутримышечно. Терапию неврологических расстройств не применяет, так как потеря сознания обычно кратковременна (не более 15–20 с). При ожогах III и IV степеней врач проводит первичную реанимацию: освобождает верхние дыхательные пути и поддерживает их свободную проходимость, делает искусственную вентиляцию легких и закрытый массаж сердца. Реанимационные процедуры проводятся в течение нескольких часов. Затем врач госпитализирует ребенка в хирургическое отделение больницы.